

Votre enfant présente une bronchiolite aigüe et est inclus dans le réseau Bronchiolib.


Comment éviter la contagion ?

Vacciner contre la GRIPPE les parents et adultes qui s'occupent de l'enfant

→ Lavage simple des mains au savon

Quand ?

- Avant et après la toilette ou le change de votre bébé
- Avant et après tout geste de la vie quotidienne (ex : préparation des repas, mouchage, après avoir été aux toilettes, au retour des transports en commun ...)



Quel produit utilisé ?

- Savon liquide doux (si utilisation de savon en pain, il doit être posé de manière à bien sécher)
- Essu-main propre et sec

Comment réaliser le soin ?

- Temps de savonnage est de 30 secondes
- Se mouiller les mains et les poignets
- Appliquer une dose de savon
- Se laver chaque main en insistant entre les doigts et autour des ongles
- Se rincer les mains abondamment : sécher avec l'essuie-mains



→ Lavage avec gel ou produit alcoolique

Comment ?

Sur vos mains propres et sèches, remplir de produits et se frotter les mains (paume, dos doigts, ongles, poignets) jusqu'à séchage complet



Précautions

Comment ?

- Pas de tabac
- Rester à votre domicile
- Port d'un masque si besoin
- Eviter tout contact avec d'autres personnes malades

Bronchiolib est financé par l'ARS des pays de la Loire, l'URPS médecins libéraux, l'URML, l'URPS infirmiers libéraux (URPS IL)

Avec la collaboration de la CPAM et du service de pédiatrie du CHU de Nantes