

Bronchiolib

GÉRER LA BRONCHIOLITE À DOMICILE

Votre enfant présente une bronchiolite aigüe et est inclus dans le réseau Bronchiolib.

Comment reconnaître la gêne respiratoire de mon bébé ?



NORMAL

IL y a **moins de 60 respirations** pas minutes


Narines **immobiles**

Lèvres **roses**

Pas de bruit à la respiration

Pas de creux entre les côtes

Le ventre et le thorax se soulèvent **ensemble** à chaque respiration



PAS NORMAL

IL y a **plus de 60 respirations** pas minutes

Narines qui **bougent** avec la respiration

Lèvres **bleues**

Sifflement ou geignement pendant la respiration

Creux entre les côtes ou **au niveau de clavicules** ou **du cou** pendant la respiration

Le ventre et le thorax se soulèvent **chacun leur tour**

Bronchiolib est financé par l'ARS des pays de la Loire, l'URPS médecins libéraux, l'URML, l'URPS infirmiers libéraux (URPS IL)

Bronchiolib

GÉRER LA BRONCHIOLITE À DOMICILE

Votre enfant présente une bronchiolite aigüe et est inclus dans le réseau Bronchiolib.

Comment prendre la température de mon bébé ?

Deux méthodes

- Mettre le thermomètre sous les aisselles en rajoutant 0.5°
- ou dans les fesses

Quel matériel ?

- Utiliser un thermomètre électronique à embout souple

Quand ?

- Le matin au réveil et le soir
- Quand votre bébé change de comportement

Que faire ?

- Si vous êtes inquiet



- Pas de bain



Bronchiolib est financé par l'ARS des pays de la Loire, l'URPS médecins libéraux, l'URML, l'URPS infirmiers libéraux (URPS IL)

Avec la collaboration de la CPAM et du service de pédiatrie du CHU de Nantes

Bronchiolib

GÉRER LA BRONCHIOLITE À DOMICILE

Votre enfant présente une bronchiolite aiguë et est inclus dans le réseau Bronchiolib.

Comment moucher mon bébé ?

Quand ?

- Avant chaque repas
- Avant de coucher votre enfant
- Si le nez de votre enfant est bouché



Quel produit utilisé ?

- Une boîte de mouchoir
- Sérum physiologique en dosette de 5 ml



Comment réaliser le soin ?

1. Se laver les mains ;
2. Installer le bébé sur le dos, sur un plan dur et sécurisé ;
3. Tourner la tête sur un côté et bien la maintenir ;
4. Introduire doucement la dosette de sérum physiologique à l'entrée de la narine supérieure de votre bébé ;
5. Presser franchement et rapidement au minimum la moitié de la pipette de sérum physiologique dans le nez de votre enfant ;
6. Essuyer le nez avec un mouchoir pour recueillir les sécrétions ;
7. Renouveler le geste dans la deuxième narine ;
8. Se laver les mains.



Bronchiolib est financé par l'ARS des pays de la Loire, l'URPS médecins libéraux, l'URML, l'URPS infirmiers libéraux (URPS IL)

Avec la collaboration de la CPAM et du service de pédiatrie du CHU de Nantes

Bronchiolib

GÉRER LA BRONCHIOLITE À DOMICILE

Votre enfant présente une bronchiolite aiguë et est inclus dans le réseau Bronchiolib.

Comment coucher mon bébé ?

Avant le coucher

- Prendre sa température 
- Moucher votre bébé avec le sérum physiologique 
- Attendre 15 minutes après un repas avant de l'allonger

Les recommandations

- Toujours sur le dos
- Dans un lit à barreaux, sur un matelas ferme
- Pas de tour de lit, oreiller, couette, peluche, bavoir et collier
- Avec une turbulette ajustée à sa taille
- Température de la pièce entre 18° et 20°



Bronchiolib est financé par l'ARS des pays de la Loire, l'URPS médecins libéraux, l'URML, l'URPS infirmiers libéraux (URPS IL)